


筆跡の時間情報を用いたメンタルヘルス不調の予兆把握

研究概要 うつ病等のメンタルヘルス不調は再発率が高いため、予防措置を講ずることが有効です。そこで筆跡の時間情報を用いて、メンタルヘルス不調の予兆把握ができることを見出しました。



生命科学部 生命科学科

川口 英夫 教授 Hideo Kawaguchi

研究キーワード:メンタルヘルス不調 ストレス 筆跡 スクリーニング

URL: <http://www.toyo.ac.jp/site/dlsc/kawaguchi.html>

研究シーズの内容

近年、メンタルヘルス不調者が急増し、社会問題となっています。メンタルヘルス不調は再発率が高いため、早期発見し発症そのものを防ぐ方策が求められています。そこで本研究では、『デジタルペン』を用いて取得した筆跡データからメンタルヘルス不調の予兆把握が可能か、4年間の追跡研究で検討しました。

ボランティア学生 200 名（4 年間通しての参加者 151 名）に、筆跡を 13 ms、0.3 mm の時空間分解能で記録できるデジタルペンを用いて内田クレペリン検査（図 1 参照）を受検していただきました。さらに精神健康度を測定する質問用紙 GHQ30 にも記入していただきました。デジタルペンで得られた筆跡データから数字『4』、『5』、『7』の 1 ストローク目と 2 ストローク目の間隔時間（ t_1 ）および数字の書き終わりから次の数字の書き始めの間隔時間（ t_2 ）を抽出し（図 2 参照）、これらの時間の比をストローク間隔時間比（ t_2/t_1 ）としました（図 3 参照）。この指標（ t_2/t_1 ）がメンタルヘルス不調について予測力を持つか、4 年間の追跡研究（コホート研究）を実施しました。その結果、『 $t_2/t_1 \geq 10$ の群（A 群）』は『 $t_2/t_1 < 10$ の群（B 群）』と比べ、休学・退学率が有意に異なる（ $p < 0.01$ ）ことが明らかとなりました。さらに、1 年目と 3 年目の社会的活動障害のスコアで A 群・B 群間に有意差が見られた（1 年目・3 年目共に $p < 0.05$ ）。なお、この研究は東洋大学・倫理審査委員会が承認されたプロトコルに従い実施しました。

以上より、指標 t_2/t_1 はメンタルヘルス不調の予兆把握に有用であることが示唆されました。特に社会的活動障害のスコアの高い人、すなわち人間関係に苦手意識を持つ人はリスクが高いと考えられます。




図 1 デジタルペンと内田クレペリン検査





図 2 筆跡の時間構造の例

図 3 t_2/t_1 の分布の比較

活用例・産業界へのアピールポイント

- ① メンタルヘルス不調の予防のためのスクリーニングツール
- ② ストレスの定量的把握ツール

特記事項(関連する発表論文・特許名称・出願番号等)

【発表】 Kawaguchi H et al., *Neurosci Abstr*, 343 (2015)

【出願特許】 特開 2010-131280：川口他、精神状態判定支援方法および装置