

おもな学校感染症一覧表

もしかかったら・・・
学校をお休みしてください

学校感染症と診断された場合は学校に連絡をして下さい。その後は医師の指示にしたがい、登校の許可が出ましたら所定の用紙「出席停止証明書(治癒証明書)」(ホームページよりダウンロード可)に記入していただき登校の際、担任にご提出ください。



○第1種の感染症 治癒するまで出席停止とする。

エボラ出血熱・クリミアコンゴ出血熱・痘そう・ペスト・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎(ポリオ)・細菌性赤痢・ジフテリア
--


○第2種の感染症 診断がいたら学校に速やかに連絡をする。医師の示に従い出席停止期間を守る。

病名	出席停止	主な症状	侵入経路	潜伏期間	伝染可能期間	予防方法	好発季節
インフルエンザ	発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで。	急激な発熱、頭痛、関節痛、全身倦怠感、咳、鼻水、のどの痛み	飛沫	1～3日	発病後3～4日	うがい、手洗い、マスク、予防接種	冬
百日咳	特有の咳が消失するまで、又は5日間の適切な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。	はじめは軽い咳、のどの発赤がみられる。発病後1週間くらいから咳のあとヒューと音を立てて息を吸う症状が長く続く。	飛沫	1～2週	発病後4週間	予防接種	夏
麻疹(はしか)	解熱した後3日を経過するまで	発熱、咳、鼻水、目やに。頬の内側に白い斑点コプリック斑ができる。発熱4日目より皮膚に発疹。	飛沫	9～12日	発疹のでる5日前からでた後4日間	予防接種	冬～春
流行性耳下腺炎(おたふく)	耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで	発熱、耳の下(両側、または、片側)が大きく腫れて痛む。食欲不振、えん下困難。	飛沫	2～3週間	発病前7日から発病後9日間	予防接種	冬～春
風疹	発疹が消失するまで	発熱、発疹、耳の後ろ、首、わきの下などの腫れ。結膜が充血	飛沫	2～3週間	発疹のでる7日前からでた後7日間	予防接種	春～夏
水痘(水ぼうそう)	すべての発疹が痂皮化するまで	水泡のある発疹が、体の中に次々と出る。かさぶたとなり、先に出たものからなおっていく。	飛沫	2～3週間	発疹のでる1日前から後の6～7日	予防接種	冬～春
咽頭結膜熱(プール熱)	主症状が消退した後2日を経過するまで	発熱、のどの痛み、結膜炎。首のリンパ節の腫れ。	気道結膜接触汚染物	5～7日	発病後2～3週間	充血している者やめやにの出ている者は水泳禁止とする。	夏～秋
結核	症状により学校医その他の医師において、感染の恐れがないと認めるまで	初期は自覚症状なし。X線で発見されることが多い。疲労感、寝汗、微熱、肩こり、咳、痰	飛沫	1～2ヶ月		BCG接種。X線による早期発見。栄養と休養	なし

○第3種の感染症 症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

コレラ	症状により、学校医、その他の医師において感染の恐れがないと認めるまで 	米のとぎ汁様な水様便、嘔吐。	経口	1～2日		手洗いの励行 トイレ消毒 加熱消毒を十分にすること	春～夏
細菌性赤痢		血便、発熱、しびり腹		4～8日			
腸管出血大腸菌感染症(O-157)		激しい腹痛ではじまり、数時間後に水様性の下痢を起こす。嘔吐、嘔気がある。					
腸チフス		高熱、腸出血					
パラチフス		高熱、腸出血					
流行性角結膜炎		涙がよく出る。目やに、異物が入っている感じ。結膜が充血する	結膜接触汚染物	5～7日	発病後2～3週間	感染力が強いので患者の触ったものをよく消毒しておく。手洗いの励行 水泳禁止	春～夏 5月頃
急性出血性結膜炎		激しい充血、出血してくる。		1～2日	発病後5～7日		春～夏

<第3種 その他の感染症> 症状により、学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。

ヘルパンギーナ	症状によっては、学校医、その他の医師の診断により登校可能 	高熱(38～39℃)ののどの痛み、発赤、のどの奥に小さな水泡疹、潰瘍	飛沫	2～7日	発病後2～3日	外出を避ける	夏
溶連菌感染症		高熱(39℃)発疹、扁桃腺の発赤や腫れ、のどの痛み、イチゴ舌	飛沫	2～5日	治療開始後24時間	うがい、手洗い	
マイコプラズマ肺炎		発熱、乾性の激しい咳が続く、のどの痛み、胸部レントゲン陰影	飛沫	2～3週間	急性期	マスク	
伝染性紅斑(りんご病)		両頬に少し盛り上がった麻疹様の発疹、手足に網目状の紅斑、発熱	飛沫	10～20日	発疹の出る1～2週間前の数日間		冬～春
手足口病		軽い発熱(2～3日)小さな水泡が口の中や手足にできる	飛沫	2～7日	症状のある期間	手洗い、消毒	夏
RSウイルス感染症		発熱、鼻水、咳、喘鳴、呼吸困難	飛沫・接触	2～8日	症状前～3週間	手洗い、うがい	冬
感染性胃腸炎 流行性嘔吐下痢症(ロタ、ノロなど)		発熱、腹痛、下痢、嘔吐・便が白くなる(ロタ)	経口・飛沫	1～3日	症状がある期間	手洗い、消毒	
EBウイルス感染症		発熱、リンパ節腫脹、のどの痛み	唾液	4～6週間			